



# PLÁNTULAS DE TETELA

## GUIA PARA EL CULTIVO DE AQUILEGIA

(*Aquilegia flabellata*, *A. Caerulea*, *A. hybrida*)  
Nombre común: Aquilegia, Columbina  
Por Ing. Federico Martínez M.

Época de producción: Septiembre a Abril

### PRESENTACIONES

| Maceta | No. plantas | Espaciamiento     | Ciclo* (sem) |
|--------|-------------|-------------------|--------------|
| 4"     | 1           | 25/m <sup>2</sup> | 14 - 16      |
| 5"     | 1           | 20/m <sup>2</sup> | 16 - 18      |
| 6"     | 1           | 16/m <sup>2</sup> | 18 - 20      |
| 7"     | 1           | 10/m <sup>2</sup> | 20 - 22      |

\*A partir del trasplante de la plántula.

### SUSTRATO

Requieren un sustrato ligero pero con buena retención de humedad, pH de 5.5 a 5.8. Se puede usar :

1) Ingrediente base (40% a 60%) :

- Tierra de hoja entera revuelta con tierra de hoja composteada, o bien, revuelta con cualquier otro material previamente composteado.
- Fibra de coco.
- Turba canadiense (Peat Moss).

2) Ingrediente con alta retención de humedad (20% a 30%):

- Polvillo de coco.
- Turba canadiense (Peat Moss).
- Vermiculita.

3) Ingrediente con alta porosidad (20% a 30%) :

- Tezontle.
- Tepojal
- Arena de río mediana.
- Perlita.

### RIEGOS

Esta planta no requiere de mucha agua. Se recomienda vigilar el medio de cultivo constantemente y regar cuando esté medio seco (cada tercer día).

### FERTILIZACIÓN

Para fertilizar en el agua de riego, proporcionar la siguiente dosis dos veces por semana:

Por cada 1000 lts. de agua de riego :

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Nitrato de Amonio   | 420 gr. |
| Nitrato de Potasio  | 450 gr. |
| Acido Fosfórico     | 120 ml. |
| Sulfato de Magnesio | 100 gr. |
| Multiquel o similar | 60 gr.  |

También se puede usar:  
Peters 20-10-20 o similar 1000 gr.

Al inicio de la floración se debe aplicar la siguiente dosis :

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Nitrato de Amonio    | 300 gr. |
| Fosfato Monopotásico | 580 gr. |
| Sulfato de Magnesio  | 100 gr. |
| Multiquel o similar  | 60 gr.  |

También se puede usar para ésta etapa :  
Peters 10-30-20 o similar 1000 gr.

Si incorporó algún fertilizante al sustrato, se deben reducir las cantidades anteriores de manera proporcional durante el tiempo que se espera que dure el fertilizante incorporado.

Si va a fertilizar en seco, se puede aplicar:  
Triple 17 o similar 1 gr./lto. sustrato cada 25 días

### LUZ

Requiere de alta intensidad luminosa (4000 a 6000 pies candela). Se recomienda sombreo de 40% a 50%.

### TEMPERATURA

Tolera temperaturas de 8°C hasta 24°C. El rango óptimo es de 12°C a 20°C. Requiere temperaturas frías (vernalización) para florear.

### PODAS

No requiere.

### PLAGAS Y ENFERMEDADES

El principal enemigo es la araña roja. También es atacado por plagas comunes, tales como mosca blanca, pulgón, minador, trips, babosos y otras. Pueden ser controladas con Endosulfan, Diazinón, Paratión metílico o similares. Consulte a su proveedor de agroquímicos.

Es susceptible de enfermedades fungosas, tales como la cenicilla, botritis y pudrición de raíz. Se recomiendan aplicaciones preventivas de fungicidas si las condiciones ambientales son de alta humedad relativa. Para prevención y control, se puede usar Benlate, Manzate, Ridomil y otros. Consulte a su proveedor.